

RED SATIPO

OBSTA. RUTH CALDERÓN HUAMÁN
Director de la Red Satipo

Obsta. Mayumi Mabel Ponce Laureano
Responsable de Epidemiología

Lic. Enf. Yudi Rojas Montaña
Soporte de Epidemiología

CONTENIDO

Sarampión	Pág.1
Enfermedad diarreica aguda (EDAs)	Pág.2
Infecciones respiratorias agudas (IRAs)	Pág.3
Neumonía	Pág.4
Vigilancia de febriles	Pág.4
Dengue	Pág.5
Malaria por <i>Plasmodium Vivax</i>	Pág.6
Leishmaniasis	Pág.7
Leptospirosis	Pág. 7
Ofidismo	Pág. 8
Sífilis no especificada	Pág.8
Sífilis materna	Pág. 9
Hepatitis B	Pág. 9
Mapa epidemiológico de las enfermedades acumuladas de vigilancia epidemiológica Red Integrada de Salud Satipo S.E. 25 – 2026	Pág.10

EDITORIAL

Sarampión



El sarampión es una enfermedad viral aguda, altamente contagiosa y prevenible mediante vacunación. Se transmite por vía respiratoria a través de gotas y aerosoles expulsados al toser, estornudar o hablar. Se caracteriza por fiebre alta, tos, coriza, conjuntivitis y exantema maculopapular generalizado. Debido a su elevada transmisibilidad, la vigilancia epidemiológica y el mantenimiento de coberturas óptimas de vacunación son fundamentales para prevenir brotes y proteger a la población susceptible. La prevención principalmente incluye:

- Mantener el esquema de vacunación completo según la edad.
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
- Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.
- Ventilar adecuadamente los ambientes de la vivienda.
- Evitar el contacto cercano con personas que presenten fiebre y erupciones en la piel.
- Acudir inmediatamente al establecimiento de salud ante la presencia de síntomas compatibles con sarampión.
- Mantener el aislamiento domiciliario de los casos sospechosos o confirmados hasta recibir indicaciones del personal de salud.


Hasta la semana epidemiológica 25, a nivel nacional se notificaron 873 casos de sarampión. La mayor concentración de casos se registró en Puno con 814 casos, seguido por Arequipa con 27 casos, Cusco 9 casos, Lima 7, Lambayeque 3, Moquegua 2, Huánuco 2, Tacna 1 y Madre de Dios un caso. Estos reportes evidencian una distribución predominantemente focalizada en la región Puno.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA - EDA

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), se define como diarrea la deposición de heces sueltas o líquidas, tres o más veces al día.

- EDA acuosa: deposiciones más de 3 a más en 24 horas
- EDA Disentérica: Aumento de frecuencia y fluidez de deposiciones con evidencia de sangre en heces y meco.
- Enfermedad diarrea persistente: Toda diarrea que inicia con una diarrea aguda infecciosa por más de 14 días.


Gráfico 01. Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 Hbts. de las enfermedades diarreas agudas (EDAs), RED SATIPO 2022 – 2026*



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

El gráfico 01 muestra la evolución de los casos de Enfermedades Diarreicas Agudas en la Red de Satipo durante el período 2022–2026. Se observa un incremento de episodios en el año 2023, seguido de una disminución progresiva en los años posteriores. Para la S.E. 25 del presente año se reportaron 1330 episodios, lo que equivale a un TIA de 29,5 por cada 1000 habitantes.

Gráfico 02. Canal endémico de EDAs por semana epidemiológica, RED SATIPO 2026 a la S.E. 25



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

La Red de Satipo, en la S.E. 25, ha notificado 50 episodios de EDAs, del acumulado es de 1330, donde:

- 1324 episodios de EDAs acuosas.
- 6 episodios de EDAs disentéricas.

Tabla 01. EDAs disentéricas por distritos 2026 de la Red de Satipo

ACUMULADO DE PISODIOS DE EDAs DISENTERICAS EN <5 AÑOS RED SATIPO					
DISTRITO	< 1 a.	1-4 a.	TOTAL	%	RAZON*
COVIRIALI	0	0	0	0.0%	0.0
LLAYLLA	0	0	0	0.0%	0.0
MAZAMARI	1	3	4	66.7%	1.5
PAMPA HERMOSA	0	0	0	0.0%	0.0
PANGOA	0	0	0	0.0%	0.0
RIO NEGRO	0	0	0	0.0%	0.0
RIO TAMBO	0	0	0	0.0%	0.0
SATIPO	2	0	2	33.3%	0.5
VIZCATAN DEL ENE	0	0	0	0.0%	0.0
Total	3	3	6	100.0%	8.4

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

De los 6 episodios acumulados de EDAs disentéricos, 3 correspondió a < 1 año del distrito Mazamari y Satipo; 3 episodios a niños de entre 1 y 4 años, siendo este curso de edad el más afectado en el distrito de Mazamari.

Tabla 02. EDAS acuosas por distritos, Red Satipo 2026 a S.E. 25

ACUMULADO DE PISODIOS DE EDAs ACUOSAS EN <5 AÑOS RED SATIPO								
DISTRITO	DAA <1 a.	DAA 1-4 a.	TOTAL	%	RAZON*	DEF.	LET.	MORT.
COVIRIALI	3	20	23	1.7%	65.5	0	0	0
LLAYLLA	6	29	35	2.6%	87.7	0	0	0
MAZAMARI	67	187	254	19.2%	96.0	0	0	0
PAMPA HERMOSA	3	20	23	1.7%	61.5	0	0	0
PANGOA	20	72	92	6.9%	11.3	0	0	0
RIO NEGRO	28	88	116	8.8%	47.8	0	0	0
RIO TAMBO	98	360	458	34.6%	82.6	0	0	0
SATIPO	65	193	258	19.5%	68.9	0	0	0
VIZCATAN DEL ENE	11	54	65	4.9%	91.4	0	0	0
Total	301	1023	1324	100.0%	1862.2	0	0	0

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

A la S.E. 25, el distrito Mazamari presenta muy alto riesgo de EDAs, seguido por Vizcatan de Ene, mientras que el distrito Llaylla se ubica en alto riesgo. El distrito Coviriali, Pampa Hermosa, Satipo y Rio Tambo presentan un mediano riesgo de enfermar por EDAs.




La red de Satipo de los episodios acumulados de enfermedad diarrea aguda no notificó defunciones, ni hospitalizaciones.

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA - IRA

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un conjunto de infecciones que afectan desde los oídos, la nariz y la garganta hasta los pulmones, ocasionadas en su mayoría por virus, pero también por bacterias o parásitos, y constituyen una importante causa de morbilidad, fundamental en niños menores de 5 años.

Las IRAs se transmiten de persona a persona a través de las gotitas de saliva que expulsamos al toser o estornudar, o por contacto con superficies contaminadas, como manijas de puertas, barandas en el transporte público, mesas o escritorios.

Gráfico 03. Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A.) x 1000 Hbts. De las IRAs, RED SATIPO 2022 – 2026




Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

Los episodios de Infecciones Respiratorias Agudas aumentaron del 2022 al 2023, luego muestran una tendencia descendente marcada para el año 2025. A S.E. 25 la Red de Satipo notificó 4573 episodios, y de cada 1000 habitantes 294,7 niños menores de 5 años enfermaron por IRA. De los cuales:

- 2573 casos corresponden a IRA no neumonía.
- 25 casos corresponden a neumonía y 5 casos a neumonía grave.
- 10 casos corresponden a SOB/Asma en menores de 5 años.

Gráfico 04. Canal endémico de IRAs (no neumonías) por semana epidemiológica, RED SATIPO, 2026 - SE 25



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

El canal endémico de IRAs en menores de 5 años muestra que a la semana 25 ha disminuido la tendencia, ubicándose en zona segura. Durante el periodo evaluado S.E. 25 se evidencia un 210 episodio, de un acumulado de 4573 casos.


Tabla 03. Incidencia acumulada x 1000 Hbts. en casos de IRAs por distritos a la S.E. 25 RED SATIPO, 2026.

DISTRITO	EPISODIO					TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA AJUSTADA X 1000 HAB
	IRA_M2	IRA_2_11	IRA<1	IRA_1_4A	IRA<5	
COVIRIALI	3	20	23	102	125	323.0
LAYLLA	4	29	33	107	140	361.8
MAZAMARI	37	240	277	637	914	357.5
PAMPA HERMC	0	22	22	97	119	341.0
PANGO	8	98	106	213	319	323.5
RIO NEGRO	9	101	110	270	380	161.0
RIO TAMBO	27	368	395	1276	1,671	312.9
SATIPO	32	230	262	489	751	204.9
VIZCATAN	2	35	37	117	154	250.4
TOTAL	122	1143	1265	3308	4,573	274.7

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

Hasta la S.E. 25, la tasa de incidencia acumulada ajustada de la Red de Satipo es de 274,7 por 1.000 habitantes (bajo riesgo de enfermar). Pero Llaylla (361.8 x 1,000) y Mazamari (357.5 x 1,000) son los distritos con mayor incidencia, mientras Río Negro y Satipo tienen bajo riesgo de enfermar por IRAs.

Gráfico 07. Número de hospitalizados por IRA de 2022 – 2026, a S.E. 25




Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

Hasta la S.E. 25 la Red de Satipo, ha notificado 14 hospitalizados en niños menores de años, lo que evidencia la mayor vulnerabilidad de esta etapa de vida.

NEUMONIA

La neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno. La neumonía es la principal causa de mortalidad infantil en todo el mundo.


Gráfico 05. Neumonía de Red de Satipo x TIA de la SE 25



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

En el gráfico 5 se observa el comportamiento fluctuante, con una disminución sostenida entre 2022 y 2024, seguida de un incremento marcado en 2025. La Red de Satipo a la semana 25 del año 2026 ha notificado 31 episodios de neumonía, teniendo un TIA de 2 por mil habitantes.

Gráfico 06. Casos de neumonía/hospitalizados/defunciones en <5 años de Red de Satipo a la S.E. 25 - 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).


A la S.E. 25 se tiene un acumulado de 31 episodios de neumonía en niños menores de 5 años:

- 25 casos de neumonía, 20 de 1 a 4 años y 5 en < de 2 año.
- 6 casos de neumonía grave, 3 de 1 a 4 años, 2 en <1 año y 2 en lactante menor de 2 meses.
- 11 casos de neumonía en el distrito de Satipo, 10 en Mazamari, 4 en Río Negro, 5 en Río Tambo y 1 en Pangoa.

FEBRILES

Es una estrategia de vigilancia epidemiológica que consiste en analizar el incremento de febriles con y sin foco, reportado semanalmente en todos los establecimientos de salud. Su objetivo es identificar e investigar oportunamente brotes de enfermedades transmitidas por vectores y otras enfermedades que cursan con un cuadro febril en su fase aguda de la enfermedad.


Gráfico 07. Canal endémico de febriles de Red Satipo a S.E. 25.



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

La Red de Satipo en la S.E. 25 ha notificado 140 febriles, el acumulado es de 4645 febriles. La tendencia va disminuyendo desde la S.E. 24 posicionando en zona segura en comparación con semanas anteriores.

Gráfico 08. Vigilancia de febriles por grupo etario hasta la SE 25 de la Red de Satipo, 2026.




Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

Además, los febriles reportados corresponde curso de vida que comprendido entre 20 y 59 años con 39,7% de casos, mientras que el menos afectado son menores de 1 año con 5% febriles.

ENFERMEDADES METAXÉNICAS: DENGUE

El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, *Aedes aegypti*. Es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve y una fiebre incapacitante, acompañados de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones y eritema. La enfermedad puede progresar a formas graves en horas, caracterizadas principalmente por hemorragias y extravasación de plasma y/o daño grave de órganos.


Gráfico 09. Tasa de incidencia de dengue Red Satipo 2020-2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

En la Red de Satipo, en el año 2020 fue el pico de incidencia más alta de los últimos 7 años. Del año 2023 al 2024 existió fluctuación con transmisión persistente. De 2024 a 2025 ha ido disminuyendo la incidencia de dengue. Al año 2026, hasta la SE 26 se notificaron 130 casos, de los cuales 126 casos son autóctonos y 4 son casos importados de otra región. El TIA es 70 por cada 10000 habitantes.

Gráfico 10. Canal endémico de dengue de la Red de Satipo 2026




Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

El canal endémico de dengue evidencia comportamientos fluctuantes entre semanas en el primer semestre del año. En la semana 25 se registró 2 casos confirmados, donde en

comparación con la semana anterior se evidencia incremento, pero nos ubica en zona de éxito, por ello fortalecer las acciones preventivas y control vectorial.

Gráfico 10. Número de casos confirmados de dengue por Semana Epidemiológica de la provincia de Red Satipo, 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

El análisis comparativo de los casos confirmados de dengue en la Red Satipo evidencia que el año 2024 presentó la mayor carga epidemiológica, con picos superiores a 50 casos semanales. En contraste, el 2025 mostró una reducción progresiva de casos y el 2026 mantiene actualmente niveles bajos de transmisión.

Tabla 05. Casos de dengue confirmados por distritos y clasificación por forma clínica RED SATIPO, 2026

DISTRITO	CASOS ACUMULADOS	PROPORCIÓN	CASOS EN LA SE 25	T.I.A x 1000	FORMA CLINICA						N° FALLECIDOS	TASA DE LETALIDAD
					SIN SIGNOS DE ALARMA		CON SIGNOS DE ALARMA		DENGUE GRAVE			
					N	%	N	%	N	%		
COVIRIALI	4	3.2%	0	0.63	3	75.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0
LLAYLLA	1	0.8%	0	0.13	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0
MAZAMARI	37	29.4%	2	0.86	25	67.6%	10	27.0%	2	5.4%	0	0
RIO NEGRO	34	27.0%	0	1.00	28	82.4%	6	17.6%	0	0.0%	0	0
RIO TAMBOR	7	5.6%	0	0.25	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
SATIPO	38	30.2%	0	0.64	30	78.9%	8	21.1%	0	0.0%	0	0
PANGOA	5	4.0%	0	0.96	4	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0
PAMPA HERMOSA	0	0.0%	0	0.00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0
VIZCAYAN DEL NORTE	0	0.0%	0	0.00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0
RED SATIPO	126	100.0%	2	0.70	97	77.0%	27	21.4%	2	1.6%	0	0.00
IMPORTADOS												
NE SHUYA	1						1					
ATALAYA	2				1		1					
PICHANAQUI	1				1							

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

Según clasificación se tiene:

- Dengue sin signos de alarma: 97 casos (77%).
- Dengue con signos de alarma: 27 casos (21%).
- Dengue grave: 2 caso (1,6%).

El distrito con mayor proporción de casos es Satipo con 30.2% (38), seguida de Mazamari 29,4% (37) y Río Negro 27% (34).

Según la etapa de vida: la etapa adulta con 38%, joven con 34%, niños y adolescentes con 12% respectivamente y adulta mayor con 4%. Asimismo, con mayor proporción en el sexo femenino con 57% y masculino con 43%.


MALARIA

La malaria es una enfermedad infecciosa parasitaria causada por protozoarios del género *Plasmodium* (*P. falciparum*, *P. vivax*, *P. malariae*, *P. ovale* y *P. knowlesi*), que se transmite al ser humano por la picadura de la hembra del mosquito *Anopheles* infectado.

Se caracteriza clínicamente por fiebre, escalofríos, sudoración, cefalea, malestar general y anemia.

Es una enfermedad prevenible y curable, cuya transmisión ocurre principalmente en zonas endémicas como la Provincia de Satipo.


Gráfico 11. Índice Parasitario Anual (IPA) de malaria P. vivax de la Red de Satipo del 2020 a 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

En la Red de Satipo, el año 2022 fue el que tuvo el IPA más alta de los últimos 7 años. A la actualmente presenta una I.P.A. de 9,78 casos por cada 10000 habitantes (Hbts) hasta la S.E. 25.

Gráfico 12. Canal endémico de MALARIA P. VIVAX por semana epidemiológica, Red Satipo, S.E. 25 - 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

El canal endémico de malaria por *Plasmodium vivax* de la Red Satipo 2026 evidencia transmisión activa durante el primer semestre del año, con picos fluctuantes entre semanas; sin embargo, los valores se mantienen dentro de los límites esperados y no alcanzan la zona de brote.

A S.E. 25 en comparación con la semana anterior se observa reducción significativa de casos y ubicándose en zona entre éxito, lo que sugiere control epidemiológico favorable. Pero se recomienda:

- Mantener la vigilancia epidemiológica activa.
- Continuar con búsqueda activa de febriles y diagnóstico oportuno.
- Intensificar de manera sostenida las acciones de control vectorial y educación comunitaria.


Tabla 06. Casos de malaria por distritos Red Satipo, 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA REPORTADOS EN LOS AÑOS 2022 - 2026				Nº Casos Malaria P.Vivax por Semanas Epidemiológicas			casos en la S.E 25-2026
DISTRITO	AÑOS		IPA	CORTE HASTA LA S.E25			
	2025	2026		2024	2025	2026	
RIO TAMBO	82	169	60.1	0	0	169	2
PANGOA	11	6	11.5	28	11	6	0
VIZCATAN DELENE	1	1	0.0	0	0	1	0
MAZAMARI	0	0	0.0	4	0	0	0
RIO NEGRO	0	0	0.0	0	0	0	0
COVIRIALI	0	0	0.0	0	0	0	0
SATIPO	0	0	0.0	0	0	0	0
RED SATIPO	94	176	9.7	32	11	176	2

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

El distrito con mayor caso de malaria es: Río Tambo con 169 casos acumulados, en la S.E. 25 reporto 2 casos, asimismo el IPA es 60.1 por 10000 Hbts, seguida por Pangoa con 6 casos acumulados e IPA DE 11.5 por 10000 Hbts y un caso acumulado en el distrito Vizcatan de Ene.

Gráfico 13. Casos de malaria por etapa de vida y sexo en la Red Satipo, 2026




Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

El perfil epidemiológico muestra que la mayor proporción de casos se concentra en la etapa niño (38%), seguida de adultos (25%), y jóvenes (24%) lo que sugiere mayor exposición o vulnerabilidad en poblaciones infantil. Asimismo, se observa predominio en el sexo masculino (55%) y femenino (45%).

ZOONOSIS: Leishmaniasis

Las leishmaniasis son enfermedades zoonóticas y de Transmisión vectorial con complejo ciclo de transmisión que involucra gran diversidad de parásitos, reservorios y vectores. Son causadas por diferentes especies del género *Leishmania* y se transmiten a los animales y a los humanos mediante la picadura de insectos de la familia Psychodidae.

Gráfico 14. Incidencia de leishmaniasis, RED SATIPO 2020-2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

La Red de Satipo, en el año 2021, registró el mayor número de casos de leishmaniasis con 181, seguido de un descenso progresivo hasta alcanzar su punto más bajo en 2024. En el año 2026 hasta la S.E. 25 se reportaron 48 casos acumulados de leishmaniasis, de lo cual 47 son leishmaniasis cutánea y uno mucocutánea.

Tabla 07. Casos de leishmaniasis cutánea y mucocutánea por establecimiento Distritos RED SATIPO, 2026.

DISTRITOS	LEISHMANIASIS CUTANEA		LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA		INCIDENCIA POR MIL HAB.
	CASOS EN LA S.E. 25-2026	CASOS ACUMULADOS	CASOS EN LA S.E. 25-2026	CASOS ACUMULADOS	
RIO TAMBO	0	26	0	0	0.9
MAZAMARI	0	1	0	1	0.0
RIO NEGRO	0	8	0	0	0.2
SATIPO	0	6	0	0	0.1
VIZCATAN DEL ENE	0	1	0	0	0.2
PANGO	0	3	0	0	0.6
PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.0
LLAYLLA	0	0	0	0	0.0
COVIRIALI	0	2	0	0	0.3
Total general	0	47	0	1	2.4


Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

El distrito de Río Tambo reportó 26 casos, Río Negro 8 casos y Satipo 6 casos. El perfil epidemiológico muestra que la mayor proporción en etapa adulta con 42%, seguida por joven con 27%, adolescente con 19%, niño con 8% y etapa adulta mayor con 4%. Asimismo, se observa con mayor proporción en el sexo masculino con 63% y 38% en sexo femenino.

ZOONOSIS: Leptospirosis

como a una amplia variedad de animales (incluyendo roedores, ganado y mascotas). La bacteria responsable es la *Leptospira interrogans*, Existen dos mecanismos de transmisión directa a través del contacto con la orina y tejidos del animal infectado e indirecta con el contacto con fuente de agua, suelo o alimentos contaminados.


Gráfico 15. Incidencia de leptospirosis, RED SATIPO 2021-2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

En la Red de Satipo, entre los años 2023 y 2025, los casos de leptospirosis se mostraron de manera sostenida con 6 casos respectivamente. En 2026 a la S.E. 25 se notificó 9 casos de los cuales 2 casos fue confirmado, 2 casos descartados y 4 casos en espera de resultados. Los casos confirmados corresponden al distrito de Mazamari.

Gráfico 16. Casos notificados de Leptospirosis



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

Tabla 08. Leptospirosis por etapa de vida de la Red Satipo, 2026

ETAPAS DE VIDA	SEXO		O
	Masculino	Total	
Adolescente [12-17]	0	0	0
Adulto [30-59]	1	1	0
Adulto Mayor [60 +]	0	0	0
Joven [18-29]	1	1	0
Niño [0-11]	0	0	0
Total	2	2	0


Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

Los casos corresponden a la etapa joven y adulto de sexo masculino.

PONZOÑOSO: Ofidismo

La OMS define el ofidismo como: “El envenenamiento resultante de la mordedura de una serpiente venenosa, que puede provocar efectos tóxicos locales y sistémicos en el organismo humano.”

Gráfico 16. Incidencia de ofidismo, RED SATIPO 2020-2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

En la Red de Satipo, entre 2021 y 2023 los casos de ofidismo mostraron una tendencia descendente; sin embargo, en 2024 se registró un incremento importante alcanzando el mayor número de casos del periodo. En 2025 se observa una leve reducción, mientras que en 2026 hasta la S.E. 25 los casos reportados son 58.

Tabla 09. Ofidismo por distritos, Red Satipo, 2026

DISTRITOS	OFIDISMO		DEFUNCIONES POR OFIDISMO	TASA DE LETALIDAD
	CASOS EN LA S.E.24-2026	CASOS ACUMULADOS		
RIO TAMBO	1	40	0	0.00
MAZAMARI	1	7	0	0.00
RIO NEGRO	0	2	0	0.00
SATIPO	0	4	0	0.00
VIZCATAN DEL ENE	0	0	0	0.00
PANGO	0	0	0	0.00
PAMPA HERMOSA	0	0	0	0.00
LLAYLLA	0	4	0	0.00
COVIRIALI	0	0	0	0.00
Total general	2	57	0	0.00

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).


En la S.E. 25 no se notificaron casos de ofidismo, pero se tiene un total de 58 casos acumulados. El distrito con mayores casos de ofidismo es Río Tambo con 40 casos, seguido por el distrito de Mazamari con 7 casos, Satipo con 4 casos, Río Negro 2 y Llaylla 4 casos.

El perfil epidemiológico muestra que la mayor proporción se concentra en la etapa adulta con 54% casos, seguida por etapa joven con 17% de casos, adulto mayor con 12%, adolescente con 10% y etapa niño con 7% de casos. Con predominio en el sexo masculino con 62% y femenino con 38%.

VIGILANCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL - ITS

La sífilis es una infección bacteriana causada por *Treponema pallidum* que da lugar a una morbilidad y mortalidad sustanciales. Se trata de una infección de transmisión sexual (ITS) que generalmente se transmite por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca; por medio de las transfusiones de sangre, o mediante la transmisión materno-infantil durante el embarazo.

Gráfico 17. Casos de sífilis no específica por S.E. de la Red de Satipo - 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

La Red de Satipo, en la semana 25, no notificó casos; haciendo un acumulado de 20 casos de sífilis no específica. El distrito con mayor proporción es Satipo con 9 casos, seguido por Río Negro con 5 casos, Río Tambo con 4 casos, y Mazamari con 2 casos.

Tabla 10. Sífilis no específica por curso de vida y sexo 2026

ETAPAS DE VIDA	SEXO		Total
	Femenino	Masculino	
Adolescente [12-17]	2	1	3
Adulto [30-59]	1	3	4
Adulto Mayor [60 +]	0	1	1
Joven [18-29]	6	6	12
Niño [0-11]	0	0	0
Total	9	11	20

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).


El perfil epidemiológico muestra que la mayor proporción de casos se concentra en la etapa joven con 12 casos, seguida por etapa adulto con 4 casos, adolescente con 3 y adulto mayor con un caso de sífilis no específica. Asimismo, con mayor predominio en sexo masculino con 59% y sexo femenino con 41%.

SIFILIS MATERNA

La sífilis materna es la presencia de infección por sífilis en una mujer embarazada, confirmada mediante pruebas de laboratorio, que puede causar complicaciones graves en el feto o recién nacido. La infección se transmite principalmente por:

- Relaciones sexuales sin protección con una persona infectada.
- Transmisión vertical de madre a hijo durante el embarazo o parto, produciendo sífilis congénita.

Gráfico 18. Casos de sífilis materna, por S.E. Red de Satipo, 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

La Red de Satipo, en la semana epidemiológica 25, no notificó caso de sífilis materna, teniendo un total acumulado de 15 gestantes con sífilis. El distrito con mayor proporción es Río Negro, Satipo y Mazamari con 5 casos respectivamente, Río Tambo 2 y Pangoa un caso.

Tabla 11. Sífilis materna por curso de vida, 2026

ETAPAS DE VIDA	SEXO		0
	Femenino	Total	
Adolescente [12-17]	3	3	0
Adulto [30-59]	2	2	0
Adulto Mayor [60 +]	0	0	0
Joven [18-29]	10	10	0
Niño [0-11]	0	0	0
Total	15	15	0

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).


El perfil epidemiológico muestra que la mayor proporción de casos se concentra en la etapa joven con 10 casos, 3 casos en adolescente y 2 casos en etapa adulta. Este comportamiento sugiere que la ocurrencia del evento se presenta principalmente en población joven. Asimismo, la detección de casos en estos grupos etarios resalta la importancia de fortalecer acciones de prevención, educación sanitaria y orientadas principalmente a estas poblaciones.

HEPATITIS B

La hepatitis B es una infección viral que afecta el hígado y se transmite por contacto con sangre y fluidos corporales infectados. La vacunación, el diagnóstico temprano y las medidas de prevención son fundamentales para reducir la transmisión y las complicaciones asociadas a la enfermedad.

- Contacto con sangre o fluidos corporales infectados.
- Relaciones sexuales sin protección,
- Uso compartido de agujas u objetos punzocortantes.
- Transmisión de madre a hijo durante el parto.

Gráfico 18. Casos de hepatitis B, por S.E. Red de Satipo, 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

La Red de Satipo, en la semana epidemiológica 25, no notificó caso de hepatitis, teniendo un total acumulado de 14. El distrito con mayor proporción es Satipo con 5 casos, Mazamari 3, Río Tambo 3, Río Negro 2 y Llaylla 1.

Tabla 11. Sífilis materna por curso de vida, 2026

ETAPAS DE VIDA	SEXO		Total
	Femenino	Masculino	
Adolescente [12-17]	0	0	0
Adulto [30-59]	7	6	13
Adulto Mayor [60 +]	0	0	0
Joven [18-29]	0	1	1
Niño [0-11]	0	0	0
Total	7	7	14

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 03/07/2026 (SE 25).

El perfil epidemiológico muestra que la mayor proporción de casos se concentra en la etapa adulta con casos seguida por la etapa joven con un caso de hepatitis B, con predominio el sexo masculino con 57% y 43% en sexo femenino.

Mapa epidemiológico de las enfermedades acumuladas de vigilancia epidemiológica Red Satipo

RIO NEGRO	Enfermedad	CASOS
	EDA	116
	IRA	380
	Dengue (A97.0)	28
	Dengue (A97.1)	6
	Dengue grave	0
	Leishmaniasis cutánea	8
	Ofidismo	2
	Varicela sin complicación	2
	Hepatitis B	2
	Sífilis no especificada	5
	Sífilis materna	5
	Sífilis congénita	0
	Oropuche	0
	Muerte neonatal	0
	TB C/bacteriológica confirmada	4
	Neumonía en niños <5 años	4
	Ofidismo	2

PANGOA	Enfermedad	CASOS
	EDA	92
	IRA	319
	Dengue (A97.1)	4
	Dengue (A97.0)	1
	Malaria	6
	TB C/bacteriológica confirmada	1
	Leptospirosis	0
	Hepatitis B	0
	Leishmaniasis cutánea	3
	Sífilis materna	1
	Neumonía en niños <5 años	1
	Sífilis no especificada	0

RIO TAMBO	Enfermedad	CASOS
	EDA	458
	IRA	1671
	Dengue (A97.0)	7
	Dengue (A97.1)	0
	Malaria	169
	Ofidismo	40
	Leishmaniasis cutánea	26
	Hepatitis B	3
	Sífilis no especificada	4
	Muerte perinatal	5
	Sífilis materna	2
	Sífilis congénita	1
	Neumonía en niños <5 años	5
	TB C/bacteriológica confirmada	5
	Varicela sin complicación	4

SATIPO	Enfermedad	CASOS
	EDA	258
	IRA	751
	Dengue (A97.0)	30
	Dengue (A97.1)	8
	Leishmaniasis Cutánea	6
	Ofidismo	4
	Hepatitis B	5
	Varicela sin complicación	3
	Neumonía en niños <5 años	6
	Muerte por neumonía <5 años	1
	Muerte perinatal	0
	Sífilis no especificada	8
	Sífilis congénita	2
	Sífilis materna	3
	TB C/bacteriológica confirmada	11
	Varicela sin complicación	3



LLAYLLA	Enfermedad	CASOS
	IRA	140
	EDA	35
	Hepatitis B	1
	Dengue (A97.1)	1
	TB C/bacteriológica confirmada	1
	Ofidismo	4
	Varicela sin complicación	1

MAZAMARI	Enfermedad	CASOS
	EDA	254
	IRA	914
	Dengue (A97.0)	25
	Dengue (A97.1)	10
	Dengue grave	2
	Leishmaniasis Cutánea	1
	Leishmaniasis Mucocutánea	1
	Ofidismo	8
	Leptospirosis	2
	Hepatitis B	3
	Sífilis no especificada	2
	Leptospirosis	2
	Fiebre Amarilla Selvática	0
	Muerte perinatal	1
	Sífilis materna	2
	TB C/bacteriológica confirmada	9
	Neumonía en niños <5 años	10
	Varicela sin complicación	2

PAMPA HERMOSA	Enfermedad	CASOS
	EDA	23
	IRA	119
	Dengue (A97.0)	0
	Dengue (A97.1)	0
	Leishmaniasis Cutánea	0
	Ofidismo	0
	Sífilis no específica	0
	Sífilis materna	0

COVIRIALI	Enfermedad	CASOS
	EDA	23
	IRA	125
	Dengue (A97.0)	3
	Dengue (A97.1)	1
	Ofidismo	0
	Leishmaniasis Cutánea	2
	Hepatitis B	0
	Oropuche	0
	Sífilis no especificada	0

VIZCATAN DEL ENE	Enfermedad	CASOS
	EDA	65
	IRA	154
	Dengue (A97.0)	0
	Dengue (A97.1)	0
	Ofidismo	0
	Malaria	1
	Leishmaniasis Cutánea	1
	Sífilis no especificada	0