

RED SATIPO

OBSTA. RUTH CALDERÓN HUAMÁN
Director de la Red Satipo

Obsta. Mayumi Mabel Ponce Laureano
Responsable de Epidemiología

Lic. Enf. Yudi Rojas Montaña
Soporte de Epidemiología

CONTENIDO

Temporada de bajas temperaturas	Pág.1
Enfermedad diarreica aguda (EDAs)	Pág.2
Infecciones respiratorias agudas (IRAs)	Pág.3
Neumonía	Pág.4
Vigilancia de febriles	Pág.4
Dengue	Pág.5
Malaria por <i>Plasmodium Vivax</i>	Pág.6
Leishmaniasis	Pág.7
Leptospirosis	Pág. 7
Ofidismo	Pág. 8
Sífilis no especificada	Pág.8
Sífilis materna	Pág. 9
Hepatitis B	Pág. 9
Mapa epidemiológico de las enfermedades acumuladas de vigilancia epidemiológica Red Integrada de Salud Satipo S.E. 30 – 2026	Pág.10

EDITORIAL

TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS



La temporada de bajas temperaturas en el Perú se presenta principalmente entre los meses de abril y octubre, periodo durante el cual pueden ocurrir fenómenos meteorológicos como heladas, friajes, nevadas y granizadas, con diferente intensidad según la región geográfica.

Los cambios bruscos de temperatura y la exposición a bajas temperaturas pueden favorecer el incremento de infecciones respiratorias agudas y sus complicaciones, principalmente neumonía, afectando con mayor intensidad a niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Por ello, se recomienda fortalecer las medidas de prevención, vacunación y vigilancia epidemiológica durante la temporada de bajas temperaturas.

La prevención principalmente incluye:


- Mantener el esquema de vacunación completo según la edad, especialmente contra influenza y neumococo.
- Abríguese bien, especialmente durante la noche y madrugada
- Proteja a los niños menores de 5 años y adultos mayores, quienes son más vulnerables al frío.
- Evite exponerse innecesariamente al frío y los cambios bruscos de temperatura.
- Mantenga los ambientes protegidos del frío y ventile adecuadamente la vivienda.
- Ante fiebre, tos, dificultad para respirar o decaimiento, acuda oportunamente al establecimiento de salud.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA - EDA

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), se define como diarrea la deposición de heces sueltas o líquidas, tres o más veces al día.

- EDA acuosa: deposiciones más de 3 a más en 24 horas
- EDA Disentérica: Aumento de frecuencia y fluidez de deposiciones con evidencia de sangre en heces y meco.
- Enfermedad diarrea persistente: Toda diarrea que inicia con una diarrea aguda infecciosa por más de 14 días.


Gráfico 01. Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 Hbts. de las enfermedades diarreas agudas (EDAs), RED SATIPO 2022 – 2026*



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

El gráfico 01 muestra la evolución de los casos de Enfermedades Diarreicas Agudas en la Red de Satipo durante el período 2022–2026. Se observa un incremento de episodios en el año 2023, seguido de una disminución progresiva en los años posteriores. Para la S.E. 30 del presente año se reportaron 1533 episodios, lo que equivale a un TIA de 34 por cada 1000 habitantes.

Gráfico 02. Canal endémico de EDAs por semana epidemiológica, RED SATIPO 2026 a la S.E. 30



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

La Red de Satipo, en la S.E. 30, ha notificado 27 episodios de EDAs, del acumulado es de 1330, donde:

- 1526 episodios de EDAs acuosas.
- 7 episodios de EDAs disentéricas.

Tabla 01. EDAs disentéricas por distritos 2026 de la Red de Satipo

ACUMULADO DE PISODIOS DE EDAs DISENTERICAS EN <5 AÑOS RED SATIPO					
DISTRITO	< 1 a.	1-4 a.	TOTAL	%	RAZON*
COVIRIALI	0	0	0	0.0%	0.0
LLAYLLA	0	0	0	0.0%	0.0
MAZAMARI	1	3	4	57.1%	1.5
PAMPA HERMOSA	0	0	0	0.0%	0.0
PANGO	0	0	0	0.0%	0.0
RIO NEGRO	0	0	0	0.0%	0.0
RIO TAMBO	0	0	0	0.0%	0.0
SATIPO	2	1	3	42.9%	0.8
VIZCATAN DEL ENE	0	0	0	0.0%	0.0
Total	3	4	7	100.0%	9.8

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

De los 6 episodios acumulados de EDAs disentéricos, 1 correspondió a < 1, y 3 de 1-4 años del distrito Mazamari y 2 episodios en <1 año y uno de 1-4 años del distrito de Satipo. de edad el más afectado en el distrito de Mazamari.

Tabla 02. EDAs acuosas por distritos, Red Satipo 2026 a S.E. 30

ACUMULADO DE PISODIOS DE EDAs ACUOSAS EN <5 AÑOS RED SATIPO								
DISTRITO	DAA < 1 a.	DAA 1-4 a.	TOTAL	%	RAZON*	DEF.	LET.	MORT.
COVIRIALI	3	23	26	1.7%	74.1	0	0	0
LLAYLLA	7	34	41	2.7%	102.8	0	0	0
MAZAMARI	78	204	282	18.5%	106.6	0	0	0
PAMPA HERMOSA	3	23	26	1.7%	69.5	0	0	0
PANGO	24	84	108	7.1%	13.3	0	0	0
RIO NEGRO	30	107	137	9.0%	56.4	0	0	0
RIO TAMBO	113	431	544	35.6%	98.1	0	0	0
SATIPO	72	216	288	18.9%	76.9	0	0	0
VIZCATAN DEL ENE	12	62	74	4.8%	104.1	0	0	0
Total	342	1184	1526	100.0%	2146.3	0	0	0

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

A la S.E. 30, el distrito Mazamari presenta muy alto riesgo de EDAs, seguido por Vizcatan de Ene, mientras que el distrito Llaylla se ubica en alto riesgo. El distrito Coviriali, Pampa Hermosa, Satipo y Rio Tambo presentan un mediano riesgo de enfermar por EDAs.




La red de Satipo de los episodios acumulados de enfermedad diarrea aguda no notificó defunciones, ni hospitalizaciones.

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA - IRA

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un conjunto de infecciones que afectan desde los oídos, la nariz y la garganta hasta los pulmones, ocasionadas en su mayoría por virus, pero también por bacterias o parásitos, y constituyen una importante causa de morbilidad, fundamental en niños menores de 5 años.

Las IRAs se transmiten de persona a persona a través de las gotitas de saliva que expulsamos al toser o estornudar, o por contacto con superficies contaminadas, como manijas de puertas, barandas en el transporte público, mesas o escritorios.

Gráfico 03. Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A.) x 1000 Hbts. De las IRAs, RED SATIPO 2022 – 2026




Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

Los episodios de Infecciones Respiratorias Agudas aumentaron del 2022 al 2023, luego muestran una tendencia descendente marcada para el año 2025.

En S.E. 30 se notificó 80, siendo 5527 episodios acumulados, y de cada 1000 habitantes 356.2 niños menores de 5 años enfermaron por IRA. De los cuales:

- 5527 casos corresponden a IRA no neumonía.
- 25 casos corresponden a neumonía y 10 casos a neumonía grave.
- 97 casos corresponden a SOB/Asma en menores de 5 años.

Gráfico 04. Canal endémico de IRAs (no neumonías) por semana epidemiológica, RED SATIPO, 2026 - SE 30



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

El canal endémico de IRAs en menores de 5 años muestra que a la semana 30 ha disminuido la tendencia, ubicándose en zona de éxito.

Durante el periodo evaluado S.E. 30 se evidencia un 80 episodio de IRAs y de un acumulado de 5527 casos.


Tabla 03. Incidencia acumulada x 1000 Hbts. en casos de IRAs por distritos a la S.E. 30 RED SATIPO, 2026.

DISTRITO	EPISODIO					TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA AJUSTADA X 1000 HAB
	IRA_M2	IRA_2_11	IRA<1	IRA_1_4A	IRA<5	
COVIRIALI	3	27	30	123	153	395.3
LLAYLLA	4	35	39	119	158	408.3
MAZAMARI	47	296	343	763	1106	432.5
PAMPA HERMO	0	25	25	116	141	404.0
PANGO	8	114	122	250	372	377.3
RIO NEGRO	12	120	132	325	457	193.6
RIO TAMBO	34	453	487	1565	2052	384.2
SATIPO	42	267	309	587	896	244.5
VIZCATAN	2	44	46	146	192	312.2
TOTAL	152	1381	1533	3994	5527	332.0

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

Hasta la S.E. 30, la tasa de incidencia acumulada ajustada de la Red de Satipo es de 332,0 por 1.000 habitantes (mediano riesgo de enfermar), pero Llaylla (408.3) y Mazamari (432.5) son los distritos con mayor incidencia, mientras Río Negro y Satipo tienen bajo riesgo de enfermar.

Gráfico 07. Número de hospitalizados por IRA de 2022 – 2026, a S.E. 30




Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

Hasta la S.E. 30 se ha notificado 17 hospitalizados en niños menores de años, lo que evidencia la mayor vulnerabilidad de esta etapa de vida.

NEUMONIA

La neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno. La neumonía es la principal causa de mortalidad infantil en todo el mundo.


Gráfico 05. Neumonía de Red de Satipo x TIA de la S.E. 30



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

En el gráfico 5 se observa el comportamiento fluctuante, con una disminución sostenida entre 2022 y 2024, seguida de un incremento marcado en 2025. La Red de Satipo a la semana 30 del año 2026 ha notificado 33 episodios de neumonía, teniendo un TIA de 2.13 por mil habitantes.

Gráfico 06. Casos de neumonía/hospitalizados/defunciones en <5 años de Red de Satipo a la S.E. 30 - 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).


A la S.E. 30 se tiene un acumulado de 33 episodios de neumonía en niños menores de 5 años:

- 23 casos de neumonía, 18 de 1 a 4 años y 5 en < de 2 año.
- 9 casos de neumonía grave, 3 de 1 a 4 años, 4 en <1 año y 2 en lactante menor de 2 meses.
- 12 casos de neumonía en el distrito de Satipo, 8 en Mazamari, 4 en Río Negro, 7 en Río Tambo y 2 en Pangao.

FEBRILES

Es una estrategia de vigilancia epidemiológica que consiste en analizar el incremento de febriles con y sin foco, reportado semanalmente en todos los establecimientos de salud. Su objetivo es identificar e investigar oportunamente brotes de enfermedades transmitidas por vectores y otras enfermedades que cursan con un cuadro febril en su fase aguda de la enfermedad.


Gráfico 07. Canal endémico de febriles de Red Satipo a S.E. 30.



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

La Red de Satipo en la S.E. 30 ha notificado 65 febriles, el acumulado es de 5322 febriles. La tendencia va disminuyendo desde la S.E. 28 posicionando en zona de éxito en comparación con semanas anteriores.

Gráfico 08. Vigilancia de febriles por grupo etario hasta la SE 25 de la Red de Satipo, 2026.




Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

Además, los febriles reportados corresponde al curso de vida que comprendido entre 20 y 59 años con 39,1% de casos, mientras que el menos afectado son menores de 1 año con 5,3% febriles.

ENFERMEDADES METAXÉNICAS: DENGUE

El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, *Aedes aegypti*. Es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve y una fiebre incapacitante, acompañados de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones y eritema. La enfermedad puede progresar a formas graves en horas, caracterizadas principalmente por hemorragias y extravasación de plasma y/o daño grave de órganos.


Gráfico 09. Tasa de incidencia de dengue Red Satipo 2020-2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

En la Red de Satipo, en el año 2020 fue el pico de incidencia más alta de los últimos 7 años. Del año 2023 al 2024 existió fluctuación con transmisión persistente. De 2024 a 2025 ha ido disminuyendo la incidencia de dengue. Al año 2026, hasta la SE 30 se notificaron 148 casos, de los cuales 144 casos son autóctonos y 4 son casos importados de otra región. El TIA es 80 por cada 100000 habitantes.


Gráfico 10. Canal endémico de dengue de la Red de Satipo 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

El canal endémico de dengue evidencia comportamientos fluctuantes entre semanas en el primer semestre del año. En la semana 30 se registró 2 casos confirmados, donde en comparación con la semana anterior se evidencia disminución, ubicándonos en zona de seguro.

Gráfico 10. Número de casos confirmados de dengue por Semana Epidemiológica de la provincia de Red Satipo, 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

El análisis comparativo de los casos confirmados de dengue en la Red Satipo evidencia que el año 2024 presentó la mayor carga epidemiológica, con picos superiores a 50 casos semanales. En contraste, el 2025 mostró una reducción progresiva de casos y el 2026 mantiene actualmente niveles bajos de transmisión.

Tabla 05. Casos de dengue confirmados por distritos y clasificación por forma clínica RED SATIPO, 2026

DISTRITO	CASOS ACUMULADOS	PROPORCIÓN	CASOS EN LA SE 30	TIA x 1000	FORMA CLÍNICA				Nº FALLECIDOS	TASA DE LETALIDAD
					SIN SIGNOS DE ALARMA	CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE			
COVIRIALI	4	2.8%	0	42.04	3	75.0%	1	25.0%	0	0.0%
LLAYLLA	4	2.8%	0	52.77	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%
MAZAMARI	43	29.9%	0	99.92	28	65.1%	13	30.2%	2	4.7%
RIO NEGRO	37	25.7%	0	109.04	31	83.8%	6	16.2%	0	0.0%
RIO TAMBOR	8	5.6%	0	28.46	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
SATIPO	43	29.9%	0	95.40	34	79.1%	9	20.9%	0	0.0%
PANGA	5	3.5%	0	95.60	4	80.0%	1	20.0%	0	0.0%
PAMPA HERMOSA	0	0.0%	0	0.00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0.0%
VICACAN DELEN	0	0.0%	0	0.00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0.0%
RED SATIPO	144	100.0%	0	80.00	110	76.4%	32	22.2%	2	1.4%
IMPORTADOS										
NE SHUYA	1					1				
ATALAYA	2				1	1				
PICHANAZQUI	1				1					

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

Según clasificación se tiene:

- Dengue sin signos de alarma: 110 casos (76.4%).
- Dengue con signos de alarma: 32 casos (22.2%).
- Dengue grave: 2 caso (1.4%).

El distrito con mayor proporción de casos es Satipo y Mazamari con 29.9% (43), seguida de 29,9% (43) y Río Negro 25.7% (37).

Según la etapa de vida: la etapa adulta con 37%, joven con 33%, niños con 13%, adolescentes con 11% y adulta mayor con 6%. Asimismo, con mayor proporción en el sexo femenino con 56% (80) y masculino con 44% (64).


MALARIA

La malaria es una enfermedad infecciosa parasitaria causada por protozoarios del género *Plasmodium* (*P. falciparum*, *P. vivax*, *P. malariae*, *P. ovale* y *P. knowlesi*), que se transmite al ser humano por la picadura de la hembra del mosquito *Anopheles* infectado.

Se caracteriza clínicamente por fiebre, escalofríos, sudoración, cefalea, malestar general y anemia.

Es una enfermedad prevenible y curable, cuya transmisión ocurre principalmente en zonas endémicas como la Provincia de Satipo.


Gráfico 11. Comportamiento historico de malaria *P. vivax* de la Red de Satipo del 2020 a 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

El comportamiento de la malaria por *Plasmodium vivax* en la Red de Salud Satipo muestra un incremento marcado de casos durante 2021 y 2022, alcanzando su mayor transmisión en 2022. A partir de 2023 se observa una disminución sostenida, pero en el 2026, se evidencia incremento a comparación al mismo periodo que el año anterior evidencia una tendencia favorable.


Gráfico 12. Índice Parasitario Anual (IPA) de malaria *P. vivax* de la Red de Satipo del 2020 a 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

En la Red de Satipo, el año 2022 fue el que tuvo el IPA más alta de los últimos 7 años. A la actualmente presenta un I.P.A. de 1.10 casos por cada 1000 habitantes (Hbts) hasta la S.E. 30, evidenciando un alto riesgo de transmisión.

Gráfico 12. Canal endémico de MALARIA *P. VIVAX* por semana epidemiológica, Red Satipo, S.E. 30 - 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

El canal endémico de malaria por *Plasmodium vivax* de la Red Satipo 2026 evidencia un brote y transmisión activa durante el primer semestre del año, con picos fluctuantes entre semanas; sin embargo, a la S.E. 30 se reportó 3 casos de malaria, manteniéndose dentro de los límites esperados ubicándonos en zona de éxito a comparación con la semana anterior.

Tabla 06. Casos de malaria por distritos Red Satipo, 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA REPORTADOS EN LOS AÑOS 2022 - 2026							N° Casos Malaria P.Vivax por Semanas Epidemiológicas					casos en la S.E 29 2026
DISTRITO	AÑOS					IPA	CORTE HASTA LA S.E29					
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026	
RIO TAMBO	1377	208	292	82	191	6.8	982	147	231	46	188	3
PANGOA	408	22	28	11	6	1.1	337	19	19	11	6	0
VIZCATAN DEL ENE	80	55	154	1	1	0.2	77	43	105	1	1	0
MAZAMARI	3	1	4	0	0	0.0	2	0	0	0	0	0
RIO NEGRO	3	0	0	0	0	0.0	3	0	0	0	0	0
COVIRIALI	1	0	0	0	0	0.0	1	0	0	0	0	0
SATIPO	0	2	0	0	0	0.0	0	2	0	0	0	0
RED SATIPO	1872	288	478	94	198	1.1	1402	211	355	58	195	3

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

El distrito con mayor caso de malaria es:


- Río Tambo con 191 casos acumulados, en la S.E. 30 reporto 3 casos, asimismo el IPA es 6.8, siendo un mediano riesgo de transmisión.
- Pangoa con 6 casos acumulados e IPA DE 1.15 siendo un mediano riesgo de transmisión.
- Vizcatan de Ene un caso acumulado, siendo un bajo riesgo de transmisión.

El perfil epidemiológico muestra que la mayor proporción de casos se concentra en la etapa niño con 75 (38%) de casos de malaria, seguida de adultos 54 (27%), jóvenes 46 (23%), adolescente 20 (10%) y adulto mayor 3 (2%) lo que sugiere mayor exposición o vulnerabilidad en poblaciones infantil. Asimismo, se observa predominio en el sexo masculino (54%) y femenino (46%).

ZOONOSIS: Leishmaniasis

Las leishmaniasis son enfermedades zoonóticas y de Transmisión vectorial con complejo ciclo de transmisión que involucra gran diversidad de parásitos, reservorios y vectores.

Gráfico 14. Incidencia de leishmaniasis, RED SATIPO 2020-2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

La Red de Satipo, en el año 2021, registró el mayor número de casos de leishmaniasis con 181, seguido de un descenso progresivo hasta alcanzar su punto más bajo en 2024. En el año 2026 hasta la S.E. 30 se reportaron 62 casos acumulados de leishmaniasis, de lo cual 61 son leishmaniasis cutánea y uno mucocutánea.

Tabla 07. Casos de leishmaniasis cutánea y mucocutánea por establecimiento Distritos RED SATIPO, 2026.

DISTRITOS	LEISHMANIASIS CUTÁNEA		LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA		INCIDENCIA POR MIL HAB.
	CASOS EN LA S.E.30-2026	CASOS ACUMULADOS	CASOS EN LA S.E.30-2026	CASOS ACUMULADOS	
RIO TAMBO	0	31	0	0	1.1
MAZAMARI	0	1	0	1	0.0
RIO NEGRO	0	10	0	0	0.3
SATIPO	0	9	0	0	0.2
VIZCATAN DEL ENE	0	2	0	0	0.3
PANGO	0	3	0	0	0.6
PAMPA HERMOSA	0	1	0	0	0.2
LLAYLLA	0	0	0	0	0.0
COVIRIALI	0	4	0	0	0.6
Total general	0	61	0	1	3.4

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).


Los distritos con mayor caso de leishmaniasis son: Río Tambo reportó 31 casos de malaria, Río Negro 10, Satipo 9, Coviriali 4, Pangoa 3, Vizcatan del Ene 2 y Pampa Hermosa 1.

El perfil epidemiológico muestra que la mayor proporción en etapa adulta con 44%, seguida por joven con 26%, adolescente con 14%, niño y adulta mayor con 8%. Asimismo, se observa con mayor proporción en el sexo masculino con 65% y 35% en sexo femenino.

ZOONOSIS: Leptospirosis

Es una enfermedad bacteriana que afecta tanto a humanos como a una amplia variedad de animales (incluyendo roedores, ganado y mascotas). La bacteria responsable es la *Leptospira interrogans*, Existen dos mecanismos de transmisión directa a través del contacto con la orina y tejidos del animal infectado e indirecta con el contacto con fuente de agua, suelo o alimentos contaminados.


Gráfico 15. Incidencia de leptospirosis, RED SATIPO 2021-2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

En la Red de Satipo, entre los años 2023 y 2025, los casos de leptospirosis se mostraron de manera sostenida con 6 casos respectivamente. En 2026 a la S.E. 30 se notificó 11 casos de los cuales 3 casos fue confirmado. Los casos confirmados corresponden al distrito de Mazamari (2) y Coviriali (1).

Gráfico 16. Casos notificados de Leptospirosis



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

Tabla 08. Leptospirosis por etapa de vida de la Red Satipo, 2026

ETAPAS DE VIDA	SEXO		O
	Masculino	Total	
Adolescente [12-17]	0	0	0
Adulto [30-59]	1	1	0
Adulto Mayor [60+]	0	0	0
Joven [18-29]	1	1	0
Niño [0-11]	1	1	0
Total	3	3	0


Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

Los casos corresponden a la etapa niño, joven y adulto, con predominio el sexo masculino en 100%.

PONZOÑOSO: Ofidismo

La OMS define el ofidismo como: “El envenenamiento resultante de la mordedura de una serpiente venenosa, que puede provocar efectos tóxicos locales y sistémicos en el organismo humano.”

Gráfico 16. Incidencia de ofidismo, RED SATIPO 2020-2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

En la Red de Satipo, entre 2021 y 2023 los casos de ofidismo mostraron una tendencia descendente; sin embargo, en 2024 se registró un incremento importante alcanzando el mayor número de casos del periodo. En 2025 se observa una leve reducción, mientras que en 2026 hasta la S.E. 30 los casos reportados son 65 casos.

Tabla 09. Ofidismo por distritos, Red Satipo, 2026

DISTRITOS	OFIDISMO		DEFUNCIONES POR OFIDISMO	TASA DE LETALIDAD
	CASOS EN LA S.E.30-2026	CASOS ACUMULADOS		
RIO TAMBO	0	44	0	0.00
MAZAMARI	0	10	0	0.00
RIO NEGRO	0	2	0	0.00
SATIPO	0	5	0	0.00
VIZCATAN DEL ENE	0	0	0	0.00
PANGO	0	0	0	0.00
PAMPA HERMOSA	0	0	0	0.00
LLAYLLA	0	4	0	0.00
COVIRIALI	0	0	0	0.00
Total general	0	65	0	0.00

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).


Los distritos con mayor caso de ofidismo a la S.E. 30 son: Río Tambo con 44 casos, Mazamari con 10 casos, Satipo con 4 casos, Río Negro 2 y Llaylla 4 casos.

El perfil epidemiológico muestra que la mayor proporción se concentra en la etapa adulta con 52% casos, seguida por etapa joven con 17% de casos, adulto mayor con 16%, adolescente con 9% y etapa niño con 6% de casos. Con predominio en el sexo masculino con 63% y femenino con 37%.

VIGILANCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL - ITS

La sífilis es una infección bacteriana causada por *Treponema pallidum* que da lugar a una morbilidad y mortalidad sustanciales. Se trata de una infección de transmisión sexual (ITS) que generalmente se transmite por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca; por medio de las transfusiones de sangre, o mediante la transmisión materno-infantil durante el embarazo.

Gráfico 17. Casos de sífilis no específica a S.E. 30 de la Red de Satipo - 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

La Red de Satipo, en la semana 30, no notificó casos; siendo un acumulado de 24 casos de sífilis no específica. El distrito con mayor proporción es Satipo con 10 casos, seguido por Río Negro con 5 casos, Río Tambo con 54 casos, Mazamari con 3 casos y Pangoa con un caso.

Tabla 10. Sífilis no específica por curso de vida y sexo 2026

ETAPAS DE VIDA	SEXO		Total
	Femenino	Masculino	
Adolescente [12-17]	3	1	4
Adulto [30-59]	1	4	5
Adulto Mayor [60 +]	0	1	1
Joven [18-29]	6	8	14
Niño [0-11]	0	0	0
Total	10	14	24

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).


El perfil epidemiológico muestra que la mayor proporción de casos se concentra en la etapa joven con 14 casos, seguida por etapa adulta con 5 casos, adolescente con 4 y adulto mayor con un caso de sífilis no específica. Asimismo, con mayor predominio en sexo masculino con 58% (14) y sexo femenino con 41% (10).

SIFILIS MATERNA

La sífilis materna es la presencia de infección por sífilis en una mujer embarazada, confirmada mediante pruebas de laboratorio, que puede causar complicaciones graves en el feto o recién nacido. La infección se transmite principalmente por:

- Relaciones sexuales sin protección con una persona infectada.
- Transmisión vertical de madre a hijo durante el embarazo o parto, produciendo sífilis congénita.

Gráfico 18. Casos de sífilis materna, por S.E. Red de Satipo, 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

La Red de Satipo, en la semana epidemiológica 30, no notificó caso de sífilis materna, teniendo un total acumulado de 21 gestantes con sífilis.

El distrito con mayor proporción es Río Negro con 6 casos, Satipo con 6 casos, Mazamari con 5, Río Tambo 3 y Pangoa un caso.

Tabla 11. Sífilis materna por curso de vida, 2026

ETAPAS DE VIDA	SEXO		0
	Femenino	Total	
Adolescente [12-17]	3	3	0
Adulto [30-59]	3	3	0
Adulto Mayor [60 +]	0	0	0
Joven [18-29]	15	15	0
Niño [0-11]	0	0	0
Total	21	21	0

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).


El perfil epidemiológico muestra que la mayor proporción de casos se concentra en la etapa joven con 15 casos, 3 casos en adolescente y 3 casos en etapa adulta. Este comportamiento sugiere que la ocurrencia del evento se presenta principalmente en población joven. Asimismo, la detección de casos en estos grupos etarios resalta la importancia de fortalecer acciones de prevención, educación sanitaria y orientadas principalmente a estas poblaciones.

HEPATITIS B

La hepatitis B es una infección viral que afecta el hígado y se transmite por contacto con sangre y fluidos corporales infectados. La vacunación, el diagnóstico temprano y las medidas de prevención son fundamentales para reducir la transmisión y las complicaciones asociadas a la enfermedad.

- Contacto con sangre o fluidos corporales infectados.
- Relaciones sexuales sin protección,
- Uso compartido de agujas u objetos punzocortantes.
- Transmisión de madre a hijo durante el parto.

Gráfico 18. Casos de hepatitis B, por S.E. Red de Satipo, 2026



Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

La Red de Satipo, en la semana epidemiológica 30, no notificó caso de hepatitis, teniendo un total acumulado de 15 casos.

El distrito con mayor proporción es Satipo con 5 casos, Río Tambo 4, Mazamari 3, Río Negro 2 y Llaylla 1.

Tabla 11. Sífilis materna por curso de vida, 2026

ETAPAS DE VIDA	SEXO		Total
	Femenino	Masculino	
Adolescente [12-17]	0	0	0
Adulto [30-59]	7	7	14
Adulto Mayor [60 +]	0	0	0
Joven [18-29]	0	1	1
Niño [0-11]	0	0	0
Total	7	8	15

Fuente: Notiweb-Oficina de epidemiología Red Satipo (*) Hasta 05/08/2026 (SE 30).

El perfil epidemiológico muestra que la mayor proporción de casos se concentra en la etapa adulta con 7 casos seguida por la etapa joven con un caso de hepatitis B, con predominio el sexo masculino con 53% y 47% en sexo femenino.


Mapa epidemiológico de las enfermedades acumuladas de vigilancia epidemiológica Red Satipo

RIO NEGRO	Enfermedad	CASOS
	EDA	137
	IRA	457
	Dengue (A97.0)	31
	Dengue (A97.1)	6
	Dengue grave	0
	Leishmaniasis cutánea	10
	Ofidismo	2
	Varicela sin complicación	2
	Hepatitis B	2
	Hepatitis A	1
	Sífilis no especificada	5
	Sífilis materna	6
	Sífilis congénita	0
	Oropuche	0
	Muerte perinatal	1
	TB C/bacteriológica confirmada	5
	Neumonía en niños <5 años	4
	Ofidismo	2

PANGOA	Enfermedad	CASOS
	EDA	108
	IRA	372
	Dengue (A97.1)	4
	Dengue (A97.0)	1
	Malaria	6
	TB C/bacteriológica confirmada	1
	Leptospirosis	0
	Hepatitis B	0
	Leishmaniasis cutánea	4
	Sífilis materna	1
	Neumonía en niños <5 años	1
	Sífilis no especificada	1

RIO TAMBO	Enfermedad	CASOS
	EDA	544
	IRA	2052
	Dengue (A97.0)	8
	Dengue (A97.1)	0
	Malaria	169
	Ofidismo	44
	Leishmaniasis cutánea	31
	Hepatitis B	4
	Sífilis no especificada	5
	Muerte perinatal	8
	Sífilis materna	3
	Sífilis congénita	1
	Neumonía en niños <5 años	5
	TB C/bacteriológica confirmada	6
	Varicela sin complicación	4

SATIPO	Enfermedad	CASOS
	EDA	288
	IRA	896
	Dengue (A97.0)	34
	Dengue (A97.1)	9
	Leishmaniasis Cutánea	9
	Ofidismo	5
	Hepatitis B	5
	Varicela sin complicación	3
	Neumonía en niños <5 años	6
	Muerte por neumonía <5 años	1
	Muerte perinatal	0
	Sífilis no especificada	10
	Sífilis congénita	2
	Sífilis materna	6
	TB C/bacteriológica confirmada	15
	Varicela sin complicación	4



LLAYLLA	Enfermedad	CASOS
	IRA	140
	EDA	58
	Hepatitis B	1
	Dengue (A97.0)	2
	Dengue (A97.1)	2
	TB C/bacteriológica confirmada	1
	Ofidismo	4
	Varicela sin complicación	1

MAZAMARI	Enfermedad	CASOS
	EDA	282
	IRA	110
	Dengue (A97.0)	6
	Dengue (A97.1)	28
	Dengue grave	13
	Dengue grave	2
	Leishmaniasis Cutánea	1
	Leishmaniasis Mucocutánea	1
	Ofidismo	10
	Leptospirosis	2
	Hepatitis B	3
	Sífilis no especificada	4
	Leptospirosis	2
	Fiebre Amarilla Selvática	0
	Muerte perinatal	1
	Sífilis materna	5
	TB C/bacteriológica confirmada	4
	Neumonía en niños <5 años	10
	Varicela sin complicación	2

PAMPA HERMOSA	Enfermedad	CASOS
	EDA	26
	IRA	141
	Dengue (A97.0)	0
	Dengue (A97.1)	0
	Leishmaniasis Cutánea	1
	Ofidismo	0
	Sífilis no específica	0
	Sífilis materna	0

COVIRIALI	Enfermedad	CASOS
	EDA	26
	IRA	153
	Dengue (A97.0)	3
	Dengue (A97.1)	1
	Ofidismo	0
	Leishmaniasis Cutánea	4
	Hepatitis B	0
	Oropuche	0
	Muerte perinatal	1
	Sífilis no especificada	0

VIZCATÁN DEL ENE	Enfermedad	CASOS
	EDA	74
	IRA	192
	Dengue (A97.0)	0
	Dengue (A97.1)	0
	Ofidismo	0
	Malaria	1
	Leishmaniasis Cutánea	2
	Sífilis no especificada	0